

INFORMACJA DLA POWODZIAN O ZWALCZANIU SZKODLIWYCH I UCIAŹLIWYCH OWADÓW

Po powodzi na terenach zalanych mogą występować plagowo różne gatunki much, komarów, meszek, kuczmanów. W zaistniałych okolicznościach znajdują one dobre warunki rozwoju.

MUCHY

Owady te są przerosicielami groźnych chorób zakaźnych: duru brzuszego, czerwonki, salmonellozy, letnich biegunek niemowląt, także niektórych schorzeń grzybiczych i pasożytniczych.

Muchy siadają na rozkładających się resztkach żywności, martwych zwierzętach, odchodach ludzkich i zwierzęcych, składają tam jaja i zbierają na powierzchni swojego owłosionego ciała miliony bakterii. Z jaj wylęgają się robakowate, beznogie, kremowe larwy. Po kilku do kilkunastu dniach przekształcają się one w poczwarki (brązowe, baryłkowate), z których wylatują dorosłe owady. Cały rozwój much trwa ok. 2 tygodni, w przypadku wysokich temperatur może być krótszy.

Przestrzeganie higieny w domu i obejściu jest najważniejszym czynnikiem zabezpieczającym przed owadami i przenoszonymi przez nie chorobami.

Należy, więc:

- do dezynfekcji nieczystości, padliny, śmieci, fekaliów stosować wapno chlorowane, wapno palone. Wapno palone należy używać w postaci 20% mleka wapniowego (1 szklankę wapna (to około 200g) zmieszać z 1 litrem wody). Stosować w ilości 10-20 litrów na 1m² powierzchni – polewać lub opryskiwać (np. zmiotką zanurzoną w zawieszynie) do momentu, aż cała powierzchnia równomiernie zostanie pokryta białą cieczą. Zamiast wapna palonego można użyć 10 % zawiesziny wapna chlorowanego (1/2 szklanki zamieszać z 1litrem wody),
- doły z płynną zawartością zasypać suchym wapnem palonym, stosując 1 kg wapna na 1 m² powierzchni.

UWAGA! Przy przygotowaniu zawiesziny i stosowaniu wapna używać gumowych rękawic!

ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEŃ PRZED MUCHAMI

- okna i inne otwory osłonić siatką metalową, gazą lub gęstą firaną,
- lupy rozwieszać w miejscach gromadzenia się much,
- żywność przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub po przykryciem,
- śmieci i odpady gromadzić w szczelnych workach foliowych,
- zmieniać w miarę możliwości często ściótkę dla zwierząt, aby zapobiec rozwojowi larw much.

ZWALCZANIE MUCH PREPARATAMI CHEMICZNYMI

Do zwalczania dorosłych much w pomieszczeniach można stosować wszelkie, dostępne na rynku, przeznaczone do tego celu preparaty owadobójcze: trutki, tablice owadobójcze, preparaty do opryskiwania powierzchni, preparaty aerozolowe.

Opryskiwać: futryny drzwi i okien, nasłonecznione powierzchnie ścian.

Do zwalczania larw much można stosować preparat Malasep (polewanie śmieci i odpadów), Neporex, Baycidal (niszczenie larw w ściółce).

KOMARY I INNE OWADY KRWIOPIJNE

W rozlewiskach wody, mule i wilgotnej glebie rozwijają się larwy komarów, meszek, kuczmanów. Dorosłe komary i znacznie od nich mniejsze kuczmany kłują (tylko samiec) szczególnie intensywnie przy dużej wilgotności powietrza i o zmierzchu; wtedy też mogą wlatywać do pomieszczeń. Ukłucia komarów i kuczmanów mogą powodować odczyny zapalne skóry, obrzęki, bąble.

Meszki, przypominające małe czarne muszki, atakują podczas dnia, w pełnym słońcu. Kłują boleśnie i często pozostawiają krwawiący ślad. Na ich ukłucia narażone są zwierzęta przebywające na pastwiskach. Ukłucia tych owadów mogą powodować zmiany skórne, stany zapalne, zaburzenia oddechowe (harara). Zaatakowane przez chmary meszek zwierzęta mogą zginąć wskutek działania jadu owadów, toteż przy dużej agresywności meszek nie należy wyprowadzać zwierząt z pomieszczeń.

ZABEZPIECZENIE OSOBISTE PRZED KOMARAMI I INNYMI OWADAMI KRWIOPIJNYMI:

- odpowiednia odzież – długie spodnie, bluza z długimi rękawami, nakrycie głowy osłaniające czoło i kark,
- na odsłonięte powierzchnie skóry (z wyjątkiem twarzy) stosować repelenty, czyli środki odstrasżające komary. Preparaty te w postaci płynów, kremów lub aerozoli; zabezpieczają na kilka godzin, są do nabycia w drogeriach. W przypadku ich braku można stosować olejek goździkowy (do nabycia w aptekach),
- Na zaognione miejsce po ukłuciu stosować np. kompresy z wody z octem.

ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEŃ

- osłonić okna i inne otwory siatką metalową, gazą lub gęstą firanką,
- łóżeczka dziecięce i wózki osłonić gazą,
- nie otwierać okien przy zapalonym świetle wieczorem, gdyż zwabia ono komary,
- udrożnić rynny, aby umożliwić spływ wody.

ZWALCZANIE KOMARÓW PREPARATAMI CHEMICZNYMI

- w pomieszczeniach można zastosować dostępne na rynku środki owadobójcze, takie jak do zwalczania much, aerozole lub do opryskiwania, albo elektrofumigatory (urządzenia elektryczne z płytką owadobójczą, z której wydzielają się pary substancji owadobójczej),
- zwalczenie komarów występujących plagowo na dużych obszarach przeprowadzają wyspecjalizowane ekipy w porozumieniu z odpowiednimi Wydziałami Ochrony Środowiska i WSSE.

UWAGA!

- **Wszystkie środki należy używać ostrożnie, zgodnie z zaleceniami producenta, umieszczonymi na etykiecie preparatu. Chronić dzieci przed kontaktem z preparatem. Nie stosować preparatów przy niezabezpieczonej żywności,**
- **Zbyt intensywne używanie preparatów aerozolowych w zamkniętym pomieszczeniu może spowodować wybuch w przypadku wadliwej instalacji elektrycznej, otwartego ognia lub żaru. Nie opryskiwać preparatami urządzeń i przewodów elektrycznych**